NOTA SOBRE LA DISTRIBUCION DE CARPODIPTERA AMELIAE
(TILIACEAE), EN MEXICO

Carpodiptera ameliae Lundell (Tiliaceae).- México, Nayarit, a 4 km. del Campamento Balleto sobre el camino a la torre receptora de televisión, Isla María Madre., 10 enero 1981, O. Téllez 4164 y H. Sánchez Mejorada (MEXZ). Escasos, población pequeña en cañada húmeda con selva mediana subcaducifolia, alt. 100-150 m. Asociada con *Ficus cotinifolia*, *Ficus padifolia*, *Cedrela odorata*, *Bursera simaruba* y *Trichilia hirta*. Colectada en fruto inmaduro, determinada por Fernando Chiang (MEXU).

Distribución conocida previa: Vertiente del Golfo de México; en los Estados de S.L.P., Puebla, Veracruz y Tabasco. (Herbarios consultados-MEXU, ENCB). Bibliografía consultada: Eastwood. A., *Proc. Calif. Acad. Sci.* 6, 18: 442-468, 1929. Ferris. R. S., *Contr. Dudley Herb.* 1 (2): 63-81, 1927. González O.J., *Bol. Pro. Cult. Reg.* 2() 2: 5-9, 1936. Pennington. T.D. & J. Sarukhán, *Inst. Nac. Inv. Forest. SAG.* México, 1968. Rzedowski. J. & R. McVaugh, *Contr. Univ. Mich. Herb.* 9: 1-123, 1966.

Significado: Primer registro para la vertiente del Océano Pacífico, en las Islas Marias, Nayarit; límite de su anterior distribución conocida a 800 km.

OSWALDO TELLEZ VALDEZ

Jardín Botánico

Instituto de Biología UNAM.

México, D.F.

AGRADECIMIENTOS

A los Drs. Fernando Chiang y Mario Sousa por la revisión del manuscrito, especialmente al primero de ellos por su sugerencia para la realización de la presente nota.