MORFOLOGÍA POLÍNICA DE ESPECIES DE LA SELVA MEDIANA SUBPERENNIFOLIA EN LA CUENCA DEL RÍO CANDELARIA, CAMPECHE

YAJAIRA DE LOS ANGELES SÁNCHEZ-DZIB^{1,2,3}, SUSANA SOSA-NÁJERA² Y
MARÍA DEL SOCORRO LOZANO-GARCÍA²

¹Centro de Ecología, Pesquería y Oceanografía del Golfo de México, Universidad Autónoma de Campeche. Campeche.

²Instituto de Geología, Universidad Nacional Autónoma de México. México D.F. 04510 México.

³Autor para la correspondencia. Correo-e: yajasd@yahoo.com.mx

Resumen: Se presenta la descripción de la morfología polínica de 81 especies pertenecientes a 29 familias de la selva mediana subperennifolia en la cuenca del río Candelaria, Campeche. Se describe el polen de algunas especies endémicas de la selva mediana subperennifolia de la península de Yucatán como son: *Diospyros cuneata*, *Croton icche*, *Acacia gaumeri*, *Bauhinia erithrocalyx*, *Calliandra houstoniana*, *Lonchocarpus longistylus*, *Trichilia minutiflora*, *Coccoloba reflexiflora*, *Neomillspaughia emarginata*, *Randia longiloba*, *Talisia floresii*, *Thinouia paucidentata* and *Pouteria amygdalina*. Las descripciones palinológicas incluyen datos sobre la estructura y ornamentación de la exina, aberturas, tamaño y forma. El polen de cada especie se ilustra con microfotografías que muestran los detalles de la exina y aberturas.

Palabras clave: Polen, morfología polínica, selva tropical, Península de Yucatán.

Abstract: Detailed pollen morphology of 81 species belonging to the semi-evergreen tropical forest of the Candelaria River Basin, Campeche is presented. Pollen morphology of some endemic species from the Yucatan peninsula semi-evergreen tropical forest are presented: *Diospyros cuneata*, *Croton icche*, *Acacia gaumeri*, *Bauhinia erithrocalyx*, *Calliandra houstoniana*, *Lonchocarpus longistylus*, *Trichilia minutiflora*, *Coccoloba reflexiflora*, *Neomillspaughia emarginata*, *Randia longiloba*, *Talisia floresii*, *Thinouia paucidentata* and *Pouteria amygdalina*. Exine ornamentation, structure, apertures, form and size of the pollen grains are included in the description. Details of ornamentation and apertures are illustrated.

Keywords: Pollen morphology, tropical vegetation, Yucatan Peninsula.

La cuenca del río Candelaria está localizada al suroeste de Campeche, con una vegetación caracterizada originalmente por selva mediana subperennifolia, aunque ha sido sustituida recientemente por áreas de cultivos y pastizales ocasionando severos cambios en la cobertura vegetal de la selva. La tasa de deforestación en la cuenca entre 1974 a 1986 fue de 1.2% y se incrementó a 2.2% entre 1986-2002, causando alteraciones en el régimen hidrológico y la biodiversidad (Benítez *et al.*, 2005). Conocer la dinámica de cambios en la vegetación en el pasado cercano es importante para evaluar la capacidad de los ecosistemas en recobrar su equilibrio después de un disturbio. En el caso concreto de la cuenca del Río Candelaria, los datos espaciales más antiguos corresponden a las primeras imágenes de

Satélite LANDSAT de la década de los 70's. Por lo anterior no es posible reconstruir los cambios históricos en la cobertura vegetal de la cuenca mediante técnicas convencionales. En este sentido, existen otras técnicas que contribuyen al estudio y la reconstrucción de condiciones pasadas de los ecosistemas. Este es el caso del análisis palinológico, el cual permite establecer los cambios en el hábitat, la composición y el tipo de comunidades que han existido en tiempos pasados como consecuencia de alteraciones y/o perturbaciones naturales y/o humanas.

El conocimiento detallado de la morfología polínica de las especies, es la herramienta para poder realizar las reconstrucciones paleo-ambientales robustas y caracterizar el impacto que ha sufrido la cuenca del río Candelaria en los

últimos cientos de años. Dado que la pared y la forma de los granos de polen son características de cada especie, el conocimiento sobre la morfología polínica es la clave para identificar a un nivel taxonómico preciso los microfósiles que se depositan en ambientes lacustres. (Alvarado y Palacios, 1987; Lozano y Martínez, 1990; Lozano *et al* 2005, 2007). Entre las investigaciones sobre la morfología polínica de la vegetación tropical de México destaca el amplio estudio palinológico de la flora de la reserva de Sian Ka'an (Palacios *et al.*, 1991) donde se describe el polen de 467 especies. Para Veracruz se han publicado varios trabajos sobre floras polínicas, de varios tipos de vegetación, como es el de Lozano y Martínez (1990) y Lozano *et al* (1995) de la selva alta perennifolia de la Estación de Biología Tropical "Los Tuxtlas". Así como el conjunto de publicaciones de la Flora de Veracruz (Ludlow *et al.*, 1983; Ayala y Ludlow, 1983; Palacios, 1984; Pedraza, 1983).

El objetivo de este estudio es describir la morfología polínica de las especies de plantas de la selva mediana subperennifolia de la cuenca del río Candelaria que sirva de base para futuras investigaciones sobre sistemática, historia de la vegetación, y melisopalinología de esta región que cuenta con una alta biodiversidad.

Materiales y Métodos

Se elaboró un listado de especies pertenecientes a la selva mediana subperennifolia de la cuenca del río Candelaria con base en literatura especializada (Arellano *et al.*, 2003; Flores, 2001; Rico y Gómez, 1979; Gómez, 1971; Gutiérrez, 2000; Niembro, 1993; Rzedowski, 1994; Rzedowski y Calderón, 1996; Wendt, 1998; Macías y del Amo, 2002; Martínez *et al.*, 2001). En cuanto al estudio morfológico del polen se tomaron los botones florales obtenidos de ejemplares de herbario, del Centro de Investigaciones Históricas y Sociales de la Universidad Autónoma de Campeche (UCAM) y el del Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY). La preparación del material palinológico, se llevó a cabo por la técnica de acetólisis de Erdtman (1969) modificada. La observación y microfotografías del material polínico se realizó con un fotomicroscopio Olympus (BH2). Las microfotografías que se presentan tienen un aumento de 1000 X, para cada fotografía 1 mm equivale a 1 μ y únicamente en los casos en que el grano de polen es muy grande se utiliza una escala menor la cual está indicada en las láminas. Las descripciones palinológicas se basaron en la terminología de Erdtman (1969), complementándose con Kremp (1965), Punt *et al.*, (1994), Roubik y Moreno (1991). En el estudio inicial se describieron un total de 152 granos de polen que corresponden a 97 géneros y 35 familias (Sanchez-Dzib, 2007), pero en este trabajo se presentan solamente 81 especies, las cuales no se habían descrito anteriormente para la zona de la cuenca del río Candelaria. Las descripciones palinológicas están ordenadas alfabéticamente por familias

de acuerdo a Cronquist (1981) y alfabéticamente según el género y especie.

Las preparaciones palinológicas fueron depositadas en la palinoteca del Instituto de Geología de la UNAM, el herbario del Centro de Investigaciones Históricas y Sociales de la Universidad Autónoma de Campeche (UCAM) y en la palinoteca del Centro de Ecología, Pesquería y Oceanografía del Golfo de México (EPOMEX).

Resultados

A continuación se presentan las descripciones palinológicas considerando los siguientes caracteres morfológicos del polen: a) el tipo polínico, basándose en el número y tipos de aberturas; b) las aberturas, considerando la forma, estructura, tamaño y posición; c) la exina, estructura y ornamentación señalando el tipo, la forma, la distribución de los elementos con el grosor de las capas (sexina; nexina); d) la asociación, simetría y polaridad (ASP); e) la forma del grano, indicando el contorno polar y ecuatorial; f) el tamaño en micras; g) la forma de vida (FV) de la especie y finalmente información del ejemplar.

ANACARDIACEAE

Astronium graveolens Jacq. Lám. 1:1a-1b
Abertura: Tricolporado. Colpo largo de $25 \times 2 \mu$, colpo transversal circular ($3-4 \times 5-7 \mu$). Área polar pequeña (0.21).
Exina: Subtectada, reticulada, heterobrocada. Las lúminas aumentan de tamaño hacia los polos. Exina de 2μ de espesor. Sex 1; Nex 1. **ASP:** Mónada; isopolar; radiosimétrica.
Forma: Subprolado; CP: semiangular; CE: elíptico. **Tamaño:** P= 32.5μ ($27-36 \mu$) E= 26.8μ ($25-29 \mu$). **FV:** árbol.
Ejemplar: P. Alvaro M.134. **Geol.** a369.

APOCYNACEAE

Aspidosperma megalocarpon Müll. Arg. Lám. 1:2a-2b
Abertura: Estefanocolporado con 6 colpos. Colpo transversal de 4μ ancho. Margo de 2.4μ . **Exina:** Tectada, psilada. Exina de 4μ de espesor. Diferenciación entre sexina y nexina de difícil observación. **ASP:** Mónada, isopolar; radiosimétrica. **Forma:** Prolado esferoidal; CP: circular; CE: elíptico-circular. **Tamaño:** P= 45.3μ ($41-49 \mu$) E= 42.4μ ($39-47 \mu$). **FV:** árbol. **Ejemplar:** E. Martínez S. 28861. **Geol.** a371.

Rauvolfia tetraphylla L.

Lám. 1:3a-3b

Abertura: Tricolporado rara vez tetracolporado. Colpo meridional corto de $19 \times 4 \mu$. Colpo transversal longitudinal circular de 5μ con un margo de 4μ . Área polar grande (0.56).
Exina: Tectada, psilada con patrón microreticulado. Exina de 2.5μ de espesor. Sex 2; Nex 1. **ASP:** Mónada, isopolar; radiosimétrica. **Forma:** Suboblado; CP: semiangular; CE: elíptico. **Tamaño:** P= 33.8μ ($26-46 \mu$) E= 38.5μ ($29-53 \mu$). **FV:** arbusto. **Ejemplar:** E. Martínez S. 31399. **Geol.** a372.

LAMINA 1

LAMINA 1. ANACARDIACEAE: *Astronium graveolens* (1a: vista polar; 1b: vista ecuatorial)(1000x); APOCYNACEAE: *Aspidosperma megalocarpon* (2a: vista polar; 2b: vista ecuatorial) (500x); *Rauvolfia tetraphylla* (3a: vista polar; 3b: vista ecuatorial) (500x); *Stemmadenia donnell-smithii* (4: vista ecuatorial) (1000x); *Tabernaemontana alba* (5: vista polar y ecuatorial) (1000x); *Thevetia ahouai* (6: vista polar y ornamentación) (500x); *Thevetia peruviana* (7: vista polar y ornamentación) (500x).

Stemmadenia donnell-smithii

Lám. 1:4

(Rose) Woodson

Abertura: Trizonocolporado. Colpos pequeños de $22.1 \times 2.4 \mu$, colpo transversal continuo de 3μ de ancho. **Exina:** Tectada, psilada con patrón microreticulado. Exina de 3.3μ de espesor. Sex 2; Nex 1. **ASP:** Mónada; isopolar; radiosimétrica. **Forma:** Prolado; CE: elíptico. **Tamaño:** P= 58.6μ ($49-59 \mu$) E= 36.2μ ($31-42 \mu$). **FV:** árbol o arbusto. **Tipo de vegetación:** selva mediana subperennifolia, selva alta perennifolia, vegetación secundaria. **Ejemplar:** E. Martínez S. 28067. **Geol.** a549.

Tabernaemontana alba Mill.

Lám. 1:5

Abertura: Tricolporado. Colpo pequeño y estrecho de $11 \times 1 \mu$, colpo transversal alargado ($12-16 \mu$). Área polar mediana (0.39). **Exina:** Tectada, psilada con patrón microreticulado. Exina de 3μ de espesor. Sex 2; Nex 1. **ASP:** Mónada, isopolar; radiosimétrica. **Forma:** Prolado esferoidal; CP: semiangular; CE: elíptico. **Tamaño:** P= 25.7μ ($23-29 \mu$) E= 23.9μ ($20-27 \mu$). **FV:** árbol o arbusto. **Ejemplar:** E. Cabrera y H. de Cabrera 2513. **Geol.** a373.

Thevetia ahouai L. A. DC.

Lám. 1:6

Abertura: Tetracolpado o pentacolpado. Área polar mediana (0.39). **Exina:** Tectada, perforada, patrón microreticulado. Exina de 4.6μ de espesor. Sex 3; Nex 2. **ASP:** Mónada, isopolar; radiosimétrica. **Forma:** Subprolado; CP: circular-cuadrado. **Tamaño:** P= 120.5μ ($94-141 \mu$) E= 100.8μ ($66-126 \mu$). **FV:** árbol o arbusto. **Ejemplar:** E. Martínez S. 27257. **Geol.** a374.

Thevetia peruviana (Pers.) K. Schum.

Lám. 1:7

Abertura: Tricolporado. Colpo meridional corto de $45 \times 7 \mu$, colpo transversal circular de 5μ . Área polar grande (0.57). **Exina:** Tectada, perforada con patrón reticulado, heterobrocado. Perforaciones de 1μ . Exina de 4.8μ de espesor. Sex 2; Nex 1. **ASP:** Mónada, isopolar; radiosimétrica. **Forma:** Subprolado; CP: convexa; CE: elíptico. **Tamaño:** P= 90.5μ ($67-99 \mu$) E= 75.5μ ($61-106 \mu$). **FV:** árbol o arbusto. **Ejemplar:** E. Martínez S. 27644. **Geol.** a376.

ARECACEAE

Sabal mauritiformis

Lám. 2:8

(H. Karst.) Griseb. & H. Wendl.

Abertura: Monocolpado. El colpo abarca tres cuartas partes del grano. **Exina:** Subtectada, reticulada, heterobrocada. Exina de 1.6μ de espesor. Sex 2; Nex 1. **ASP:** Mónada, isopolar; bilateral. **Forma:** Oblado. **Tamaño:** E= 39.1μ ($36-43 \mu$) e= 29.0μ ($26-32 \mu$). **FV:** palma. **Ejemplar:** E. Martínez S. 27536. **Geol.** a378

Sabal yapa C. Wright ex Becc.

Lám. 2:9

Abertura: Monocolpado. Colpo largo de polo a polo con extremos redondeados. **Exina:** Subtectada, microreticulada.

Exina de 2.5μ de espesor. Sex 2; Nex 1. **ASP:** Mónada, isopolar; bilateral. **Forma:** Oblado. **Tamaño:** E= 46.6μ ($43-53 \mu$) e= 36.3μ ($28-46 \mu$). **FV:** palma. **Ejemplar:** Hermilo Quero R. 2387. **Geol.** a379.

ASTERACEAE

Milleria quinqueflora L.

Lám. 2:10

Abertura: Tricolporado. Colpo de $16 \times 4 \mu$. Colpo transversal de 2μ . Área polar grande (0.59). **Exina:** Tectada, equinada con patrón microreticulado. Espinas agudas, espínula de 5μ de altura $\times$ 3.2μ de base. Exina de 6μ de espesor. Sex 5; Nex 1. **ASP:** Mónada; isopolar; radiosimétrica. **Forma:** Prolado esferoidal; CP: circular; CE: elíptico-circular. **Tamaño:** P= 40.2μ ($37-44 \mu$) E= 36.7μ ($33-42 \mu$). **FV:** hierba. **Ejemplar:** E. Ucan y C. Chan 1599. **Geol.** a550

BIGNONIACEAE

Tabebuia rosea (Bertol.) A. DC.

Lám. 2:11

Abertura: Tricolpado a tricolporoidado. Colpo meridional largo de 39μ . Área polar pequeña (0.14). **Exina:** Subtectada, reticulada, heterobrocada. Exina de 2μ de espesor. Sex 2; Nex 1. **ASP:** Mónada, isopolar; radiosimétrica. **Forma:** Subprolado; CP: circular; CE: elíptica. **Tamaño:** P= 45.3μ ($36-52 \mu$) E= 33.9μ ($27-40 \mu$). **FV:** árbol o arbusto. **Ejemplar:** P. Alvaro M.605. **Geol.** a225.

Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth

Lám. 2:12

Abertura: Tricolpado. Colpo meridional largo y estrecho ($40-52 \mu$), membrana colpal microrreticulada. Área polar pequeña (0.16). **Exina:** Subtectada, reticulada, heterobrocada. Exina de 2μ de espesor. Sex 2; Nex 1. **ASP:** Mónada, isopolar; radiosimétrica. **Forma:** Subprolado; CP: circular; CE: elíptica. **Tamaño:** P= 50.8μ ($45-55 \mu$) E= 40.1μ ($36-44 \mu$). **FV:** árbol o arbusto. **Ejemplar:** Celso Gutiérrez B. 4940. **Geol.** a382.

BOMBACACEAE

Pseudobombax ellipticum

Lám. 2:13

(Kunth) Dugand

Abertura: Tricolporado. Colpo meridional corto de 11μ , con aberturas interangulares. Área polar grande (0.66). **Exina:** Subtectada, reticulada, heterobrocada, las luminas disminuyen hacia los ápices convirtiéndose en exina tectada. Exina de 2.1μ de espesor. Sex 2; Nex 1. **ASP:** Mónada, isopolar; radiosimétrica. **Forma:** Subprolado; CP: angular. **Tamaño:** P= 61.2μ ($51-66 \mu$) E= 47μ ($42-53 \mu$). **FV:** árbol. **Ejemplar:** P. Zamora C. 4936. **Geol.** a384

BORAGINACEAE

Cordia alliodora (Ruíz & Pav.) Oken

Lám. 2:14

Abertura: Tricolporado. Colpo meridional largo de $28 \times 2 \mu$. Colpo transversal alargado de 4.2μ de ancho. Área polar mediana (0.43). **Exina:** Tectada, con patrón microreticulado, supramicroequinada, espinas distribuidas al azar

LAMINA 2

LAMINA 2. ARECACEAE: *Sabal mauritiiformis* (8: vista ecuatorial y ornamentación) (500x); *Sabal yapa* (9: vista ecuatorial y ornamentación) (500x); ASTERACEAE: *Milleria quinqueflora* (10: vista polar y ecuatorial) (1000x); BIGNONIACEAE: *Tabebuia rosea* (11: vista polar y ecuatorial) (500x); *Tecoma stans* (12: vista polar y ecuatorial) (500x); BOMBACACEAE: *Pseudobombax ellipticum* (13: vista polar y ornamentación) (500x); BORAGINACEAE: *Cordia alliodora* (14: vista polar y ecuatorial) (1000x); BRASSICACEAE: *Lepidium virginicum* (15: vista polar y ecuatorial) (1000x); BURSERACEAE: *Protium copal* (16: vista polar y ecuatorial) (1000x); COMBRETA-CEAE: *Bucida buceras* (17: vista polar y ecuatorial) (1000x).

en el grano de polen, Exina de $2\ \mu$ de espesor. Sex 2; Nex 1. **ASP:** Mónada, isopolar; radiosimétrica. **Forma:** Subprolado; CP: circular; CE: elíptico-circular. **Tamaño:** P= $39.5\ \mu$ ($36-44\ \mu$) E= $34.0\ \mu$ ($31-39\ \mu$). **FV:** árbol. **Ejemplar:** Santiago Ramírez A. 132. **Geol.** a385.

BRASSICACEAE

Lepidium virginicum L.

Lám. 2:15

Abertura: Tricolpado. Colpo meridional largo de $16.2\ \mu$. Área polar mediana (0.32). **Exina:** Subtectada, microreticulada. Exina de $2\ \mu$. Sex 1; Nex 1. **ASP:** Mónada; isopolar; radiosimétrica. **Forma:** Subprolado; CP: semiangular; CE: elíptico. **Tamaño:** P= $20.6\ \mu$ ($17-30\ \mu$) E= $16.9\ \mu$ ($11-22\ \mu$). **FV:** hierba. **Ejemplar:** D. Álvarez D. 339. **Geol.** a553

BURSERACEAE

Protium copal

Lám. 2:16

(Schltdl. & Cham.) Engl.

Abertura: Tricolporado. Colpo largo de $23 \times 1\ \mu$. Colpo transversal alargado rectangular ($3-4 \times 6\ \mu$). Área polar grande (0.63). **Exina:** Tectada, psilada. Exina de $1.3\ \mu$ de espesor. Sex 1; Nex 1. **ASP:** Mónada, isopolar; radiosimétrica. **Forma:** Prolado; CP: semiangular; CE: elíptica. **Tamaño:** P= $31.4\ \mu$ ($28-34\ \mu$) E= $21.1\ \mu$ ($19-24\ \mu$). **FV:** árbol. **Ejemplar:** P. Alvaro M. 313. **Geol.** a226.

COMBRETACEAE

Bucida buceras L.

Lám. 2:17

Abertura: Heterocolpado, tres colporos con membrana lisa alternando con tres pseudocolpos de $15\ \mu$ de largo. Colpo transversal circular elíptico ($3 \times 4\ \mu$). Área polar grande (0.52). **Exina:** Tectada, psilada con patrón microreticulado. Exina de $1.9\ \mu$ de espesor. Sex 2; Nex 1. **ASP:** Mónada, isopolar; radiosimétrica. **Forma:** Prolado esferoidal; CP: hexalobada; CE: elíptico-circular. **Tamaño:** P= $19.6\ \mu$ ($19-22\ \mu$) E= $18.5\ \mu$ ($17-19\ \mu$). **FV:** árbol. **Ejemplar:** Celso Gutiérrez B. 5106. **Geol.** a227.

CONVOLVULACEAE

Ipomoea nil (L.) Roth

Lám. 3:18

Abertura: Periporado. Poros circulares de $6\ \mu$ de diámetro ($5-7\ \mu$). **Exina:** Tectada, equinada, espinas de $11.5\ \mu$. Exina de $6.5\ \mu$. Sex 4; Nex 2. **ASP:** Mónada; apolar; radiosimétrica. **Forma:** Esferoidal. **Tamaño:** D= $153.7\ \mu$ ($140-164\ \mu$). **FV:** hierba. **Ejemplar:** Celso Gutiérrez B. 8012. **Geol.** a552.

EBENACEAE

Diospyros cuneata Standl.

Lám. 3:19

Abertura: Tricolporado. Colpo largo de $32\ \mu$, colpo transversal alargado rectangular ($3-5\ \mu$), margo de $5\ \mu$. Área polar pequeña (0.25). **Exina:** Tectada, psilada. Exina de $1.7\ \mu$ de espesor. Sex 2; Nex 1. **ASP:** Mónada, isopolar; radiosimétrica. **Forma:** Subprolado; CP: circular; CE: elíptica. **Tamaño:** P= $41.9\ \mu$ ($38-46\ \mu$) E= $32.3\ \mu$ ($28-39\ \mu$).

FV: árbol o arbusto. **Ejemplar:** G. Carnevali, L. Solomon, F. May Pat y L. Abdala 6321. **Geol.** a389.

Diospyros digyna Jacq.

Lám. 3:20

Abertura: Tricolpado a tricolporoidado. Colpo meridional largo de $24.2\ \mu$ ($19-31\ \mu$), colpo membrana microverrugada. Área polar mediana (0.30). **Exina:** Tectada, psilada con patrón microreticulado, Exina de $1\ \mu$ de espesor. **ASP:** Mónada, isopolar; radiosimétrica. **Forma:** Subprolado; CP: circular; CE: elíptica. **Tamaño:** P= $34.5\ \mu$ ($30-37\ \mu$) E= $29.7\ \mu$ ($24-34\ \mu$). **FV:** árbol. **Ejemplar:** Santiago Ramírez A. 199. **Geol.** a390.

Diospyros verae-crucis (Standl.) Standl.

Lám. 3:21

Abertura: Tricolpado rara vez tricolporado. Colpo meridional largo de $28\ \mu$. Área polar pequeña (0.25). **Exina:** Subtectada, reticulada, heterobrocada. Exina de $2.9\ \mu$ de espesor. Sex 3; Nex 1. **ASP:** Mónada, isopolar; radiosimétrica. **Forma:** Subprolado; CP: circular; CE: elíptica. **Tamaño:** P= $37.4\ \mu$ ($30-45\ \mu$) E= $29.8\ \mu$ ($22-40\ \mu$). **FV:** árbol. **Ejemplar:** M. Méndez, R. Durán y P. Simá 398. **Geol.** a391.

EUPHORBIACEAE

Adelia barbinervis Schltdl. & Cham.

Lám. 3:22

Abertura: Tricolporado. Colpo meridional corto de $18\ \mu$, colpos membrana reticulados, colpo transversal alargado de $3.7\ \mu$ ($3 \times 5\ \mu$). Área polar mediana (0.45). **Exina:** Subtectada, reticulada, heterobrocada. Exina de $2\ \mu$ de espesor. Sex 1; Nex 1. **ASP:** Mónada, isopolar; radiosimétrica. **Forma:** Prolado esferoidal; CP: circular; CE: elíptica. **Tamaño:** P= $30.1\ \mu$ ($26-38\ \mu$) E= $26.9\ \mu$ ($24-34\ \mu$). **FV:** árbol o arbusto. **Ejemplar:** E. Martínez S. 30103. **Geol.** a39.

Croton icche Lundell

Lám. 3:23

Abertura: Inaperturado. **Exina:** Intectada, clavada con patrón crotonoide. Clavas de $3.4\ \mu$. **ASP:** Mónada, apolar; radiosimétrica. **Forma:** Esferoidal. **Tamaño:** D= $41.8\ \mu$ ($28-50\ \mu$). **FV:** hierba, arbusto o árbol. **Ejemplar:** E. Martínez S. 27725. **Geol.** a228.

Croton lundelli Standl.

Lám. 4:24

Abertura: Inaperturado. **Exina:** Intectada, clavada con patrón crotonoide. Clavas de $4\ \mu$. Exina de $4\ \mu$ de espesor. Sex 3; Nex 1. **ASP:** Mónada, apolar; radiosimétrica. **Forma:** Esferoidal. **Tamaño:** D= $51\ \mu$ ($44-56\ \mu$). **FV:** hierba o arbusto. **Ejemplar:** P. Zamora C. 4312. **Geol.** a394.

Croton reflexifolius Kunth

Lám. 4:25

Abertura: Inaperturado. **Exina:** Intectada, clavada con patrón crotonoide, clavas sostenidas por pequeñas columnelas. Clavas de $6\ \mu$. Exina de $6\ \mu$ de espesor. Sex 4; Nex 2. **ASP:** Mónada, apolar; radiosimétrica. **Forma:** Esferoidal. **Tamaño:** D= $49\ \mu$ ($41-59\ \mu$). **FV:** arbusto. **Ejemplar:** Edgar Cabrera 13543. **Geol.** a229.

LAMINA 3

LAMINA 3. CONVULVULACEAE: *Ipomoea nil* (18: corte óptico, poros y ornamentación) (500x); EBENACEAE: *Diospyros cuneata* (19: vista polar y ecuatorial) (1000x); *Diospyros digyna* (20: vista polar y ecuatorial) (1000x); *Diospyros verae-crucis* (21: vista polar y ecuatorial) (1000x); EUPHORBIACEAE: *Adelia barbinervis* (22: vista polar y ecuatorial) (1000x); *Croton icche* (23: patrón crotonoide (1000x).

FLACOURTIACEAE

Casearia corymbosa Kunth Lám. 4:26a- 26b
Abertura: Tricolporado. Colpo meridional largo de $26 \times 3 \mu$, colpo transversal lalongado circular elíptico ($4 \times 7 \mu$). Área polar mediana (0.45). **Exina:** Tectada, psilada con patrón microreticulado. Exina de 2μ de espesor. Sex 2; Nex 1. **ASP:** Mónada, isopolar; radiosimétrica. **Forma:** Prolado esferoidal; CP: circular; CE: elíptica. **Tamaño:** P= 35.9μ ($29-40 \mu$) E= 32.3μ ($27-35 \mu$). **FV:** árbol o arbusto. **Ejemplar:** Celso Gutiérrez B. 4488. **Geol.** a396.

Zuelania guidonia (Sw.) Lám. 4:27
 Britton & Millsp.

Abertura: Tetracolporado. Colpo meridional largo 21μ , colpo transversal lalongado elíptico ($3.6 \times 5.6 \mu$). Área polar mediana (0.45). **Exina:** Tectada, psilada con patrón microreticulado. Exina de 1.8μ de espesor. Sex 2; Nex 1. **ASP:** Mónada, isopolar; radiosimétrica. **Forma:** Subprolado; CP: circular-cuadrado; CE: elíptica. **Tamaño:** P= 32.4μ ($28-37 \mu$) E= 28.2μ ($24-33 \mu$). **FV:** árbol. **Ejemplar:** J. Calónico Soto 23024. **Geol.** a397.

HIPPOCRATEACEAE

Hemiangium excelsum (Kunth) A.C. Sm. Lám. 4:28
Abertura: Tricolporado. Colpo meridional largo de 25μ , colpo membrana lisa, colpo transversal circular (3.5μ). Área polar mediana (0.32). **Exina:** Subtectada, reticulada, heterobrocada. Exina de 1.3μ de espesor. Sex 2; Nex 1. **ASP:** Mónada, isopolar; radiosimétrica. **Forma:** Subprolado; CP: circular; CE: elíptica. **Tamaño:** P= 29.3μ ($23-35 \mu$) E= 22.5μ ($19-26 \mu$). **FV:** árbol. **Ejemplar:** Javier Chavelas 3084. **Geol.** a398.

LAURACEAE

Licaria campechiana (Standl.) Kosterm. Lám. 4:29
Abertura: Inaperturado. **Exina:** Tectada, equinada. Exina de 1μ de espesor. No se observa diferencia entre sexina y nexina. La pared se destruye fácilmente con la acetólisis. **ASP:** Mónada, apolar; radiosimétrica. **Forma:** Esferoidal. **Tamaño:** D= 26.7μ ($23-31 \mu$). **FV:** árbol. **Ejemplar:** Javier Chavelas 12136. **Geol.** a402.

Nectandra salicifolia (Kunth) Nees Lám. 4:30
Abertura: Inaperturado. **Exina:** Tectada, equinada. Exina de 1.8μ de espesor. Sex 1; Nex 1. **ASP:** Mónada, apolar; radiosimétrica. **Forma:** Esferoidal. **Tamaño:** D= 25.5μ ($22-33 \mu$). **FV:** árbol o arbusto. **Ejemplar:** D. Álvarez D. 677. **Geol.** a400

Nectandra sanguinea Rol. ex Rottb. Lám. 4:31
Abertura: Inaperturado. **Exina:** Tectada, equinada. Exina de 1.2μ de espesor. No se observa diferencia entre la sexina y la nexina. **ASP:** Mónada, apolar; radiosimétrica. **Forma:** Esferoidal. **Tamaño:** D= 25.1μ ($20-29 \mu$). **FV:** árbol. **Ejemplar:** F. Miranda 5348. **Geol.** a401.

LEGUMINOSAE- CAESALPINIOIDEAE

Bauhinia erythrocalyx Wunderlin Lám. 5:32
Abertura: Tricolporado a tetracolporado. Colpo meridional de 43μ de largo, colpo membrana microreticulado, colpo transversal de lalongado de $5 \times 3 \mu$. Área polar grande (0.61). **Exina:** Subtectada, reticulada, heterobrocada. Exina de 2μ de espesor. Sex 2; Nex 1. **ASP:** Mónada isopolar; radiosimétrica. **Forma:** Subprolado; CP: cuadrada a convexa. **Tamaño:** P= 55.8μ ($50-62 \mu$) E= 44.5μ ($39-52 \mu$). **FV:** hierba, arbusto o árbol. **Ejemplar:** P. Zamora C. 4392. **Geol.** a412.

Caesalpinia cacalaco Bonpl. Lám. 5:33
Abertura: Tricolporado. Colpo meridional largo de 50μ , colpo membrana microreticulado, colpo transversal circular de 6μ . Área polar grande (0.63). **Exina:** Subtectada, reticulada, heterobrocada. Exina de 3.7μ de espesor. Sex 2; Nex 1. **ASP:** Mónada, isopolar; radiosimétrica. **Forma:** Subprolado; CP: convexa; CE: elíptico circular. **Tamaño:** P= 63.6μ ($60-66 \mu$) E= 54.7μ ($52-60 \mu$). **FV:** árbol. **Ejemplar:** E. Cabrera y H. de Cabrera 15210. **Geol.** a414.

Caesalpinia vesicaria L. Lám. 5:34
Abertura: Tricolporado. Colpo meridional largo de 48μ , colpo membrana microreticulado, colpo transversal lalongado ($3 \times 8 \mu$), anillo de 2μ . Área polar grande (0.66). **Exina:** Tectada, reticulada, heterobrocada. Exina de 3.6μ de espesor. Sex 2; Nex 1. **ASP:** Mónada, isopolar; radiosimétrica. **Forma:** Prolado esferoidal; CP: convexa; CE: elíptico. **Tamaño:** P= 52.1μ ($48-54 \mu$) E= 49.2μ ($42-55 \mu$). **FV:** árbol o arbusto. **Ejemplar:** D. Álvarez D. 586. **Geol.** a416.

Cassia grandis L.f. Lám. 5:35
Abertura: Tricolporado. Colpo meridional largo de 33μ , colpo membrana lisa, colpo transversal lalongado de 3μ . Área polar mediana (0.43). **Exina:** Tectada, patrón microreticulado. Exina de 1.8μ de espesor. Sex 2; Nex 1. **ASP:** Mónada, isopolar; radiosimétrica. **Forma:** Subprolado; CP: circular; CE: elíptico. **Tamaño:** P= 36μ ($33-42 \mu$) E= 28.3μ ($26-32 \mu$). **FV:** árbol. **Ejemplar:** J. S. Flores 10467. **Geol.** a420.

Haematoxylum brasiletto H. Karst. Lám. 5:36a-36b
Abertura: Tricolporado. Colpo meridional largo de 43μ , colpo membrana microreticulada, colpo transversal lalongado de $5 \times 14 \mu$. Margo de 8μ . Área polar grande (0.69). **Exina:** Subtectada, microreticulada. Exina de 2.5μ de espesor. Sex 2; Nex 1. **ASP:** Mónada, isopolar; radiosimétrica. **Forma:** Subprolado; CP: convexa; CE: elíptico. **Tamaño:** P= 51.5μ ($48-57 \mu$) E= 43.5μ ($40-47 \mu$). **FV:** árbol o arbusto. **Ejemplar:** E. Cabrera 15299. **Geol.** a426.

LAMINA 4

LAMINA 4. EUPHORBIACEAE: *Croton lundelli* (24: patrón crotonoide) (500x); *Croton reflexifolius* (25: patrón crotonoide) (500x); FLACOURTIACEAE: *Casearia corimbosa* (26a: vista polar; 26b: vista ecuatorial) (1000x); *Zuelania guidonia* (27: vista polar y ecuatorial) (1000x); HIPPOCRATEACEAE: *Hemiangiun excelsum* (28: vista polar y ecuatorial) (1000x); LAURACEAE: *Licaria campechiana* (29: ornamentación) (1000x); *Nectandra salicifolia* (30: ornamentación) (1000x); *Nectandra sanguinea* (31: ornamentación) (1000x).

LAMINA 5

LAMINA 5. LEGUMINOSAE. CAESALPINIOIDEAE: *Bauhinia erithrocalyx* (32: vista polar y ornamentación) (500x); *Caesalpinia cacalaco* (33: vista polar y ecuatorial) (500x); *Caesalpinia vesicaria* (34: vista polar y ecuatorial) (500x); *Cassia grandis* (35: vista polar y ecuatorial) (1000x); *Haematoxylum brasiletto* (36a: vista polar y ornamentación; 36b: vista ecuatorial) (500x); *Senna atomaria* (37: vista polar y ecuatorial) (1000x); MIMOSOIDEAE: *Acacia gaumeri* (38: vista polar y ecuatorial) (1000x); *Acacia riparia* (39a: vista polar; 39b: vista ecuatorial) (500x); *Albizia tomentosa* (40: vista polar y ecuatorial) (500x).

Senna atomaria (L.)

Lám. 5:37

H. S. Irwin & Barneby

Abertura: Tricolporado. Colpo meridional largo de $30 \times 3 \mu$, colpo membrana lisa, colpo transversal con una constricción central de $3-5 \mu$. Área polar mediana (0.26). **Exina:** Tectada, psilada con patrón microreticulado. Exina de 2μ de espesor. Sex 1; Nex 1. **ASP:** Mónada, isopolar; radiosimétrica. **Forma:** Prolado; CP: circular; CE: elíptico. **Tamaño:** P= 37.6μ ($35-45 \mu$) E= 23.3μ ($19-31 \mu$). **FV:** árbol. **Ejemplar:** P. Zamora C. y J. A. Hernández T. 4393. **Geol.** a445.

LEGUMINOSAE- MIMOSOIDEAE

Acacia gaumeri S. F. Blake

Lám. 5:38

Abertura: Porada. Poros de difícil observación. **Exina:** Tectada, psilada. Exina de 1μ de espesor. **ASP:** Poliada (16 mónadas); mónadas bilaterales, isopolares. **Forma:** Poliada circular-elíptica; mónadas piramidales. **Tamaño:** D= 31.6μ ($30-34 \mu$) d= 23μ . **FV:** árbol o arbusto. **Ejemplar:** P. Zamora C. y D. Méndez D. 5160. **Geol.** a232.

Acacia riparia Kunth

Lám. 5:39a-39b

Abertura: Porada. Poros localizados en los vértices de las monadas, poros de difícil observación. **Exina:** Tectada, psilada con patrón microreticulado. Exina de 2μ de espesor. Sex 1; Nex 1. **ASP:** Poliada (16 mónadas); mónadas bilaterales, heteropolares. **Forma:** Poliada circular-elíptica; mónadas piramidales. **Tamaño:** D= 43μ ($40-47 \mu$) d= 30.4μ ($27-34 \mu$). **FV:** arbusto. **Ejemplar:** Celso Gutiérrez B. 4732. **Geol.** a408.

Albizia tomentosa (Micheli) Standl.

Lám. 5:40

Abertura: Inaperturada. **Exina:** Tectada, psilada con patrón microreticulado. Exina de 2μ de espesor. Sex 1; Nex 1. **ASP:** Poliada (16 mónadas); mónadas bilaterales, heteropolares. **Forma:** Poliada circular-elíptica; mónadas piramidales. **Tamaño:** D= 78.6μ ($72-86 \mu$) d= 77.3μ ($69-86 \mu$). **FV:** árbol. **Ejemplar:** D. Álvarez D. 635. **Geol.** a205.

Calliandra houstoniana (Mill.) Standl.

Lám. 6:41

Abertura: Porada de 4 poros. Poros localizados en los vértices de las monadas, poros de 6μ . **Exina:** Tectada, patrón microreticulado. Exina de 2μ de espesor. Sex 2; Nex 1. **ASP:** Poliada (10 mónadas); mónadas bilaterales, heteropolares. **Forma:** Poliada; mónadas cuadrangulares a piramidales. **Tamaño:** D= 166.7μ ($155-182 \mu$). **FV:** arbusto. **Ejemplar:** E. Martínez S. 29367. **Geol.** a418.

Calliandra tergemina (L.) Benth.

Lám. 6:42

Abertura: Porada. Poros de 7μ . **Exina:** Tectada, patrón microreticulado. Exina de 2μ de espesor. Sex 1; Nex 1. **ASP:** Poliada (10 mónadas); mónadas bilaterales, heteropolares. **Forma:** Poliada; mónadas cuadrangulares a piramidales. **Tamaño:** D= 154.5μ ($137-184 \mu$). **FV:** arbusto. **Ejemplar:** E. Martínez S. 30477. **Geol.** a419.

Inga vera Willd.

Lám. 6:43

Abertura: Mónadas poradas. Poros de $6-8 \mu$. **Exina:** Tectada, psilada con patrón microreticulado. Exina de 1.8μ de espesor. **ASP:** Poliada (16 mónadas); mónadas bilaterales, heteropolares. **Forma:** Poliada circular-elíptica; mónadas piramidales. **Tamaño:** D= 150.7μ ($125-185 \mu$) d= 98μ ($80-116 \mu$). **FV:** árbol. **Ejemplar:** P. Zamora C. 5188. **Geol.** a207.

Lysiloma acapulcense (Kunth) Benth.

Lám. 6:44

Abertura: Inaperturada. **Exina:** Tectada, psilada con patrón microreticulado. Exina de 2μ de espesor. Sex 1; Nex 1. **ASP:** Poliada (16 mónadas); mónadas bilaterales, heteropolares. **Forma:** Poliada circular-elíptica; mónadas piramidales. **Tamaño:** D= 82.5μ ($71-99 \mu$) d= 60.2μ ($50-72 \mu$). **FV:** árbol. **Ejemplar:** J. I. Calzada 7638. **Geol.** a437.

Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.

Lám. 7:45

Abertura: Porada. Poros localizados en los vértices, poros de $2-3 \mu$. **Exina:** Tectada, psilada con patrón microreticulado. Exina de 1.5μ de espesor. Sex 2; Nex 1. **ASP:** Poliada (16 mónadas); mónadas bilaterales, heteropolares. **Forma:** Poliada circular-elíptica; mónadas piramidales. **Tamaño:** D= 79.9μ ($67-92 \mu$) d= 56.3μ ($45-69 \mu$). **FV:** árbol o arbusto. **Ejemplar:** Celso Gutiérrez B. 5134. **Geol.** a440.

Pithecellobium lanceolatum

Lám. 7:46

(Humb. & Bonpl. ex Willd) Benth.

Abertura: Porada. Poros localizados en los vértices, poros de 2μ . **Exina:** Tectada, psilada con patrón microreticulado. Exina de 3μ de espesor. Sex 2; Nex 1. **ASP:** Poliada (16 mónadas); mónadas bilaterales, heteropolares. **Forma:** Poliada circular-elíptica; mónadas piramidales. **Tamaño:** D= 96.5μ ($86-112 \mu$) E= 60μ ($52-68 \mu$). **FV:** árbol o arbusto. **Ejemplar:** Celso Gutiérrez B. 5917. **Geol.** a442.

Pithecellobium saman (Jacq.) Benth.

Lám. 7:47

Abertura: Inaperturada. **Exina:** Tectada, psilada con patrón microreticulado. Exina de 2μ de espesor. Sex 2; Nex 1. **ASP:** Poliada (16 mónadas); mónadas bilaterales, heteropolares. **Forma:** Poliada circular-elíptica; mónadas piramidales. **Tamaño:** D= 87.6μ ($73-110 \mu$) d= 56.6μ ($52-65 \mu$). **FV:** árbol. **Ejemplar:** Celso Gutiérrez B. 5133. **Geol.** a443.

Pithecellobium stevensonii

Lám. 7:48

(Standl.) Standl. & Steyererm.

Abertura: Porada. Poros localizados en los vértices, poros de $5-8 \mu$. Anillo de 1μ . **Exina:** Tectada, psilada con patrón microreticulado. Exina de 2μ de espesor. Sex 2; Nex 1. **ASP:** Poliada (32 mónadas); mónadas bilaterales, heteropolares. **Forma:** Poliada circular-elíptica; mónadas piramidales. **Tamaño:** D= 127.6μ ($117-142 \mu$) d= 61μ ($53-71 \mu$). **FV:** árbol o arbusto. **Ejemplar:** A. Sanders 9802. **Geol.** a444.

LAMINA 6

LAMINA 6. LEGUMINOSAE. MIMOSOIDEAE: *Calliandra houstoniana* (41: vista polar y ornamentación) (500x); *Calliandra tergemina* (42: vista polar y ornamentación) (500x); *Inga vera* (43: vista polar y ecuatorial) (500x); *Lysiloma acapulcensis* (44: vista polar y ecuatorial) (500x).

LAMINA 7

LAMINA 7. LEGUMINOSAE. MIMOSOIDEAE: *Pithecellobium dulce* (45: vista polar y ecuatorial) (500x); *Pithecellobium lanceolatum* (46: vista polar y ecuatorial) (500x); *Pithecellobium saman* (47: vista polar y ecuatorial) (500x); *Pithecellobium stevensonii* (48: vista polar y ecuatorial) (500x); PAPILIONOIDEAE: *Apoplanesia paniculata* (49: vista polar y ecuatorial) (1000x); *Desmodium glabrum* (50a: vista polar; 50b: vista ecuatorial) (1000x).

LEGUMINOSAE- PAPILIONOIDEAE

Apoplanesia paniculata C. Presl. Lám. 7:49
Abertura: Tricolporado. Colpo meridional largo de $19\ \mu$, colpo membrana lisa, colpo transversal con constricción central. Área polar mediana (0.29). **Exina:** Tectada, psilada con patrón microreticulado. Exina de $1\ \mu$ de espesor. **ASP:** Mónada, isopolar; radiosimétrica. **Forma:** Subprolado; CP: circular; CE: elíptica. **Tamaño:** P= $21.8\ \mu$ (19-26 μ) E= $16.6\ \mu$ (15-19 μ). **FV:** árbol. **Ejemplar:** E. Martínez S. 27573. **Geol.** a409.

Desmodium glabrum (Mill.) DC. Lám. 7:50a-50b
Abertura: Tricolporado rara vez tetracolporado. Colpo meridional largo de $22.7\ \mu$, colpo membrana lisa, colpo transversal lalongado rectangular de $3.8 \times 14.8\ \mu$. Área polar grande (0.51). **Exina:** Tectada, psilada, patrón microreticulado. Exina de $2.5\ \mu$ de espesor. Sex 1.5; Nex 1. **ASP:** Mónada; isopolar; radiosimétrica. **Forma:** Suboblado; CP: semiconvexa; CE: elíptico. **Tamaño:** P= $37.3\ \mu$ (33-41 μ) E= $42.3\ \mu$ (36-45 μ). **FV:** hierba. **Ejemplar:** Celso Gutiérrez B. 5116. **Geol.** a557.

Gliricidia maculata (Kunth) Walp. Lám. 8:51
Abertura: Tricolporado. Colpo meridional largo de $25 \times 2\ \mu$, colpo membrana lisa, colpo transversal reducido a un endoporo de $4-7\ \mu$. Área polar mediana (0.36). **Exina:** Tectada, psilada con patrón microreticulado. Exina de $2\ \mu$ de espesor. Sex 2; Nex 1. **ASP:** Mónada, isopolar; radiosimétrica. **Forma:** Subprolado; CP: semiconvexa; CE: elíptico. **Tamaño:** P= $35.3\ \mu$ (31-39 μ) E= $27\ \mu$ (21-33 μ). **FV:** árbol. **Ejemplar:** E. Martínez S. 35431. **Geol.** a424.

Lonchocarpus castilloi Standl. Lám. 8:52a-52b
Abertura: Tricolporado. Colpo meridional largo ($24\ \mu$) y estrecho en la parte central, colpo membrana microreticulada, colpo transversal con constricción central de $4 \times 6-7\ \mu$. Área polar mediana (0.41). **Exina:** Tectada, psilada con patrón microreticulado. Exina de $2\ \mu$ de espesor. Sex 2; Nex 1. **ASP:** Mónada, isopolar; radiosimétrica. **Forma:** Subprolado; CP: semiangular; CE: elíptico. **Tamaño:** P= $27.9\ \mu$ (25-31 μ) E= $23.7\ \mu$ (22-25 μ). **FV:** árbol. **Ejemplar:** P. Zamora C. y D. Méndez D. 5638. **Geol.** a429.

Lonchocarpus guatemalensis Benth. Lám. 8:53a-53b
Abertura: Tricolporado. Colpo meridional de $27 \times 3\ \mu$, colpo membrana microreticulada, colpo transversal reducido a un endoporo de $6.5\ \mu$. Área polar mediana (0.35). **Exina:** Tectada, psilada con patrón microreticulado. Exina de $2\ \mu$ de espesor. Sex 2; Nex 1. **ASP:** Mónada; isopolar; radiosimétrica. **Forma:** Prolado; CP: semiangular; CE: elíptico. **Tamaño:** P= $32.4\ \mu$ (29-38 μ) E= $24.3\ \mu$ (20-28 μ). **FV:** árbol. **Ejemplar:** Celso Gutiérrez B. 5100. **Geol.** a430.

Lonchocarpus hondurensis Benth. Lám. 8:54a-54b
Abertura: Tricolporado. Colpo meridional largo de $23 \times 2\ \mu$, colpo membrana microreticulada, colpo transversal con constricción central de $6.2\ \mu$. Área polar mediana (0.27). **Exina:** Tectada, psilada con patrón microreticulado. Exina de $2\ \mu$ de espesor. Sex 2; Nex 1. **ASP:** Mónada; isopolar; radiosimétrica. **Forma:** Subprolado; CP: semiangular; CE: elíptico. **Tamaño:** P= $27.2\ \mu$ (25-29 μ) E= $22.5\ \mu$ (20-25 μ). **FV:** árbol o arbusto. **Ejemplar:** C. Gutiérrez B. 5110. **Geol.** a431.

Lonchocarpus longistylus Pittier Lám. 8:55
Abertura: Tricolporado. Colpo meridional largo de $24 \times 2\ \mu$, colpo membrana microreticulada, colpo transversal lalongado de $6.4\ \mu$. Área polar mediana (0.37). **Exina:** Tectada, psilada con patrón microreticulado, Exina de $2\ \mu$ de espesor. Sex 1; Nex 1. **ASP:** Mónada; isopolar; radiosimétrica. **Forma:** Subprolado; CP: semiangular; CE: elíptico. **Tamaño:** P= $30.5\ \mu$ (29-32 μ) E= $25.8\ \mu$ (21-29 μ). **FV:** árbol. **Ejemplar:** E. Ucan 4260. **Geol.** a432.

MALVACEAE

Malvaviscus arboreus Cav. Lám. 8:56
Abertura: Periporada. Poros de $4\ \mu$. **Exina:** Tectada, patrón microreticulado, supraequinada, espinas rombas, distancia entre espinas de $27\ \mu$. Exina de $13\ \mu$ de espesor. Sex 5; Nex 8. **ASP:** Mónada, apolar; radiosimétrica. **Forma:** Esferoidal. **Tamaño:** D= $210.6\ \mu$ (190-241 μ). **FV:** arbusto. **Ejemplar:** Demetrio Álvarez 2253. **Geol.** a560.

MELIACEAE

Swietenia macrophylla King Lám. 9:57
Abertura: Tetracolporado, colpo meridional largo de $21 \times 2\ \mu$, colpo transversal rectangular ($2-3 \times 4-5\ \mu$). Área polar mediana (0.30). **Exina:** Tectada, psilada. Exina de $2\ \mu$ de espesor. Sex 2; Nex 1. **ASP:** Mónada, isopolar; radiosimétrica. **Forma:** Prolado esferoidal; CP: circular; CE: elíptico. **Tamaño:** P= $31.9\ \mu$ (27-35 μ) E= $28.6\ \mu$ (25-38 μ). **FV:** árbol. **Ejemplar:** J. I. Calzada 6859. **Geol.** a454.

Trichilia arborea C. DC. Lám. 9:58a-58b
Abertura: Tetracolporado o pentacolporado. Colpo meridional largo de $27 \times 2-3\ \mu$, colpos membrana lisa, colpo transversal lalongado circular de $5\ \mu$. Área polar mediana (0.27). **Exina:** Tectada, psilada. Exina de $2\ \mu$ de espesor. Sex 2; Nex 1. **ASP:** Mónada, isopolar; radiosimétrica. **Forma:** Prolado esferoidal; CP: circular; CE: elíptico-circular. **Tamaño:** P= $37.4\ \mu$ (32-42 μ) E= $33\ \mu$ (28-38 μ). **FV:** árbol. **Ejemplar:** Ma. Guadalupe Ayala 9151. **Geol.** a455.

Trichilia havanensis Jacq. Lám. 9:59a-59b
Abertura: Tetracolporado o pentacolporado. Colpo meridional largo de $27 \times 2\ \mu$, colpo membrana lisa, colpo transversal elíptico circular de $3-4 \times 5-7\ \mu$. Área polar mediana

LAMINA 8

LAMINA 8. LEGUMINOSAE. PAPILIONOIDEAE: *Gliricidia maculata* (51: vista polar y ecuatorial) (1000x); *Lonchocarpus castilloi* (52a: vista polar; 52b: vista ecuatorial) (1000x); *Lonchocarpus guatemalensis* (53a: vista polar; 53b: vista ecuatorial) (1000x); *Lonchocarpus hondurensis* (54a: vista polar; 54b: vista ecuatorial) (1000x); *Lonchocarpus longistylus* (55: vista polar y ecuatorial) (1000x); MALVACEAE: *Malvaviscus arboreus* (56: ornamentación y corte óptico) (500x y 250x).

(0.27). **Exina:** Tectada, psilada con patrón microreticulado. Exina de $2\ \mu$ de espesor. Sex 2; Nex 1. **ASP:** Mónada, isopolar; radiosimétrica. **Forma:** Prolado esferoidal; CP: circular; CE: elíptico-circular. **Tamaño:** P= $34.7\ \mu$ (30-40 μ) E= $32.5\ \mu$ (27-38 μ). **FV:** árbol. **Ejemplar:** Celso Gutiérrez B. 5176. **Geol.** a456.

Trichilia hirta L.

Lám. 9:60

Abertura: Tetracolporado. Colpo meridional largo de $27 \times 1\ \mu$, colpo membrana lisa, colpo transversal lalongado elíptico-circular de $3-4 \times 6-10\ \mu$. Área polar mediana (0.29). **Exina:** Tectada, psilada con patrón microreticulado. Exina de $2\ \mu$ de espesor. Sex 2; Nex 1. **ASP:** Mónada, isopolar; radiosimétrica. **Forma:** Prolado esferoidal; CP: circular; CE: elíptico. **Tamaño:** P= $38\ \mu$ (33-41 μ) E= $33.7\ \mu$ (28-39 μ). **FV:** árbol. **Ejemplar:** Celso Gutiérrez B. 5254. **Geol.** a457.

Trichilia minutiflora Standl.

Lám. 9:61

Abertura: Tricolporado rara vez tetracolporado. Colpo meridional largo de $22 \times 2\ \mu$, colpo transversal lalongado elíptico-circular de $2-4 \times 5-6\ \mu$. Área polar mediana (0.33). **Exina:** Tectada, psilada con patrón microreticulado. Exina de $2\ \mu$ de espesor. Sex 2; Nex 1. **ASP:** Mónada, isopolar; radiosimétrica. **Forma:** Subprolado; CP: semiangular; CE: elíptico. **Tamaño:** P= $26.1\ \mu$ (23-30 μ) E= $22.6\ \mu$ (20-25 μ). **FV:** árbol. **Ejemplar:** D. Álvarez D. 4999. **Geol.** a458.

Trichilia moschata Sw.

Lám. 9:62

Abertura: Tricolporado rara vez tetracolporado. Colpo meridional largo de $21 \times 2\ \mu$, colpo transversal lalongado elíptico-circular de $4-5 \times 6-8\ \mu$. Margo de $3\ \mu$. Área polar mediana (0.45). **Exina:** Tectada, psilada con patrón microreticulado. Exina de $2\ \mu$ de espesor. Sex 2; Nex 1. **ASP:** Mónada, isopolar; radiosimétrica. **Forma:** Oblado esferoidal; CP: circular; CE: circular. **Tamaño:** P= $31.5\ \mu$ (28-35 μ) E= $31.8\ \mu$ (28-37 μ). **FV:** árbol. **Ejemplar:** D. Álvarez D. 4961. **Geol.** a459.

MORACEAE

Cecropia obtusifolia Bertol.

Lám. 9:63

Abertura: Diporado. Poro de $2.5\ \mu$ de diámetro, anillo de $1\ \mu$. **Exina:** Tectada, supramicroescabrada. Exina de $1\ \mu$ de espesor. Sexina y nexina difícil de observar. **ASP:** Mónada, isopolar; bilateral. **Forma:** Prolado; CP: elíptico; CE: elíptico. **Tamaño:** P= $13.4\ \mu$ (11-17 μ) E= $8.3\ \mu$ (7-10 μ). **FV:** árbol. **Ejemplar:** E. Martínez S. 7004. **Geol.** a460.

Ficus obtusifolia Kunth

Lám. 9:64

Abertura: Diporado rara vez triporado. Poro de $1.8\ \mu$ de diámetro. **Exina:** Tectada, psilada con patrón microreticulado. Exina de $1\ \mu$ de espesor. Sexina y nexina difícil de observar. **ASP:** Mónada, isopolar; bilateral o radiosimétrica. **Forma:** Oblada; CP: elíptico; CE: elíptico. **Tamaño:** P= $9.7\ \mu$ (6-12 μ) E= $14.7\ \mu$ (7-16 μ). **FV:** árbol. **Ejemplar:** G.

Carnevali, J. L. Tapia, F. May, M. Gómez, R. Jiménez y L. Sánchez 5307. **Geol.** a462.

Ficus pertusa L. f.

Lám. 10:65

Abertura: Diporado. Poro de $1.4\ \mu$ de diámetro. **Exina:** Tectada, psilada con patrón microreticulado. Exina de $1\ \mu$ de espesor. Sexina y nexina difícil de observar. **ASP:** Mónada, isopolar; bilateral. **Forma:** Oblada; CP: elíptico; CE: elíptico. **Tamaño:** P= $9.6\ \mu$ (8-11 μ) E= $15\ \mu$ (13-17 μ). **FV:** árbol. **Ejemplar:** Celso Gutiérrez B. 4366. **Geol.** a463.

Trophis racemosa (L.) Urb.

Lám. 10:66

Abertura: Diporado rara vez triporado. Poro de $2.5\ \mu$ de diámetro, anillo de $1\ \mu$. **Exina:** Tectada, escabrada. Exina de $1\ \mu$ de espesor. Sexina y nexina difícil de observar. **ASP:** Mónada, isopolar; bilateral. **Forma:** Prolado esferoidal; CP: circular; CE: elíptico. **Tamaño:** P= $18\ \mu$ (16-20 μ) E= $17.1\ \mu$ (16-20 μ). **FV:** árbol. **Geol.** a464.

NYCTAGINACEAE

Boerhavia erecta L.

Lám. 10:67

Abertura: Periporada. Poros de $5\ \mu$ y anillo de $1\ \mu$. **Exina:** Tectada, supraequinada, espinas de $5\ \mu$. Exina de $5.3\ \mu$ de espesor. Sex 3; Nex 2. **ASP:** Mónada; apolar; radiosimétrica. **Forma:** Esferoidal. **Tamaño:** D= $89.9\ \mu$ (81-105 μ). **FV:** hierba. **Ejemplar:** P. Zamora C. 4486. **Geol.** a562.

POACEAE

Cynodon dactylon (L.) Pers.

Lám. 10:68

Abertura: Monoporado o diporado, rara vez triporado. Poros circulares de $4.7\ \mu$ de diámetro, anillo de $1\ \mu$. **Exina:** Tectada, psilada, supramicroescabrada con patrón microreticulado. Exina de $2\ \mu$ de espesor. Sex 1; Nex 1. **ASP:** Mónada; isopolar o heteropolar; bilateral. **Forma:** Oblado esferoidal; CP: circular; CE: circular. **Tamaño:** P= $42.2\ \mu$ (38-47 μ) E= $43.3\ \mu$ (39-47 μ). **FV:** hierba. **Ejemplar:** Celso Gutiérrez B. y J. Balam 6472. **Geol.** a554.

Panicum laxum Sw.

Lám. 10:69

Abertura: Monoporado o diporado, rara vez triporado. Poros circulares de $3\ \mu$ de diámetro. **Exina:** Tectada, psilada con patrón microreticulado. Exina de $3\ \mu$ de espesor. Sex 2; Nex 1. **ASP:** Mónada; isopolar o heteropolar; bilateral. **Forma:** Oblado esferoidal; CP: circular; CE: circular. **Tamaño:** P= $28.6\ \mu$ (24-36 μ) E= $28.9\ \mu$ (25-36 μ). **FV:** hierba. **Ejemplar:** J. J. Ortiz y M. Magaña 2324. **Geol.** a555.

Paspalum plicatulum Michx.

Lám. 10:70

Abertura: Monoporado. Poro circular de $6.5\ \mu$ de diámetro con un anillo de $1\ \mu$. **Exina:** Tectada, psilada con patrón microreticulado. Exina de $2\ \mu$ de espesor. Sex 1; Nex 1. **ASP:** Mónada; heteropolar. **Forma:** Oblado. **Tamaño:** D= $83\ \mu$ (77-95 μ). **FV:** hierba. **Ejemplar:** J. J. Ortiz y I. Miranda 2296. **Geol.** a556.

LAMINA 9

LAMINA 9. MELIACEAE: *Swietenia macrophylla* (57: vista polar y ecuatorial) (1000x); *Trichilia arborea* (58a: vista polar; 58b: vista ecuatorial y ornamentación) (1000x); *Trichilia havanensis* (59a: vista polar; 59b: vista ecuatorial y ornamentación) (1000x); *Trichilia hirta* (60: vista polar y ecuatorial) (1000x); *Trichilia minutiflora* (61: vista polar y ecuatorial) (1000x); *Trichilia moschata* (62: vista polar y ecuatorial) (1000x); MORACEAE: *Cecropia obtusifolia* (63: vista ecuatorial y corte óptico) (1000x); *Ficus obtusifolia* (64: vista polar y ornamentación) (1000x).

POLYGONACEAE

Coccoloba reflexiflora Standl. Lám. 10:71
Abertura: Tricolporado. Colpo meridional largo de $37 \times 1 \mu$, colpo transversal lalongado de $2-3 \times 4 \mu$. Margo de 3.5μ . Área polar grande (0.61). **Exina:** Tectada, escrobiculada. Exina de 2.4μ de espesor. Sex 2; Nex 1. **ASP:** Mónada, isopolar; radiosimétrica. **Forma:** Prolado; CP: semiconvexa; CE: elíptico. **Tamaño:** P= 46μ (39-54 μ) E= 34μ (28-49 μ). **FV:** árbol. **Ejemplar:** E. Martínez S. 27581. **Geol.** a238.

Neomillspaughia emarginata Lám. 10:72
 (H. Gross.) S.F.Blake

Abertura: Tricolporado. Colpo meridional largo de $29 \times 2 \mu$, colpo transversal lalongado de $2 \times 4 \mu$. Área polar pequeña (0.16). **Exina:** Subtectada, microreticulada. Exina de 2μ de espesor. **ASP:** Mónada, isopolar; radiosimétrica. **Forma:** Prolado; CP: semiconvexa; CE: elíptico. **Tamaño:** P= 36.9μ (31-42 μ) E= 26.4μ (22-30 μ). **FV:** árbol o arbusto. **Ejemplar:** J. Calónico Soto 4333. **Geol.** a239.

RUBIACEAE

Randia longiloba Hemsl. Lám. 11:73
Abertura: Tétrada triporada. Poros de $2-4 \mu$. Anillo de 1.5μ . **Exina:** Tectada, psilada. Exina de 2μ de espesor. **ASP:** Mónada, isopolar; radiosimétrica. **Forma:** Tetrada tetraédrica. **Tamaño:** P= 35μ (29-46 μ) E= 28.1μ (20-39 μ). **FV:** árbol o arbusto. **Ejemplar:** Celso Gutiérrez B. 5172. **Geol.** a242.

SAPINDACEAE

Talisia floresii Standl. Lám. 11:74
Abertura: Tricolporado. Colpo meridional largo de $21 \times 4 \mu$, colpo membrana lisa, colpo transversal lalongado de $3 \times 6 \mu$. Margo de 2μ . Área polar mediana (0.28). **Exina:** Tectada, psilada con patrón microreticulado. Exina de 2μ de espesor. Sex 2; Nex 1. **ASP:** Mónada, isopolar; radiosimétrica. **Forma:** Oblado esferoidal; CP: semiangular; CE: elíptico-circular. **Tamaño:** P= 25.7μ (22-32 μ) E= 26.5μ (24-31 μ). **FV:** árbol. **Ejemplar:** J. Calónico Soto 23664. **Geol.** a471.

Thinouia paucidentata Radlkofer Lám. 11:75
Abertura: Triporado. Poros de $3-4 \mu$ de diámetro. Anillo de 2μ . **Exina:** Subtectada, reticulada, heterobrocada. Exina de 2μ de espesor. Sex 1; Nex 1. **ASP:** Mónada, isopolar; radiosimétrica. **Forma:** Suboblado; CP: convexa; CE: elíptico. **Tamaño:** P= 19.4μ (18-22 μ) E= 23.5μ (22-28 μ). **FV:** árbol. **Ejemplar:** M. Consuelo Sánchez G. 322. **Geol.** a244.

SAPOTACEAE

Pouteria amygdalina (Standl.) Baehni Lám. 11:76
Abertura: Tricolporado. Colpo meridional largo de $19 \times 2 \mu$, colpo transversal lalongado rectangular de $2 \times 4 \mu$, se observa un vestíbulo a nivel del colpo transversal. Área

polar mediana (0.36). **Exina:** Tectada, psilada con patrón microreticulado. Exina de 2μ de espesor. Sex 2; Nex 1. **ASP:** Mónada, isopolar; radiosimétrica. **Forma:** Prolado; CP: semiconvexa CE: elíptico. **Tamaño:** P= 28μ (26-30 μ) E= 19.6μ (16-23 μ). **FV:** árbol. **Ejemplar:** E. Martínez S., D. Álvarez D. y P. Alvaro M. 27190. **Geol.** a475.

Pouteria reticulata (Engl.) Eyma Lám. 11:77
Abertura: Tricolporado. Colpo meridional largo de $21 \times 2 \mu$, colpo transversal lalongado rectangular de $3 \times 5 \mu$. Área polar mediana (0.31). **Exina:** Tectada, psilada con patrón microreticulado. Exina de 2μ de espesor. Sex 2; Nex 1. **ASP:** Mónada, isopolar; radiosimétrica. **Forma:** Subprolado; CP: semiangular; CE: elíptico. **Tamaño:** P= 30μ (27-33 μ) E= 24.3μ (22-27 μ). **FV:** árbol. **Ejemplar:** D. Mendez D. y Christopher B. 215. **Geol.** a477.

SIMAROUBACEAE

Simarouba glauca DC. Lám. 11:78
Abertura: Tricolporado. Colpo meridional largo de $20 \times 2 \mu$, colpo transversal rectangular de $3-4 \times 5-6 \mu$. Área polar mediana (0.38). **Exina:** Tectada, psilada con patrón microreticulado. Exina de 2μ de espesor. **ASP:** Mónada, isopolar; radiosimétrica. **Forma:** Prolado; CP: semiangular; CE: elíptico. **Tamaño:** P= 28.1μ (27-32 μ) E= 18μ (17-20 μ). **FV:** árbol. **Ejemplar:** D. Álvarez D. 1169. **Geol.** a246.

TILIACEAE

Heliocarpus donnellsmithii Rose Lám. 11:79
Abertura: Tricolporado. Colpo meridional largo de $32 \times 3 \mu$, colpo transversal lalongado de $3 \times 4 \mu$. Área polar mediana (0.45). **Exina:** Subtectada, suprareticulada, heterobrocada. Exina de 2.5μ de espesor. Sex 2; Nex 1. **ASP:** Mónada, isopolar; radiosimétrica. **Forma:** Prolado; CE: elíptico. **Tamaño:** P= 44μ (42-44 μ) E= 32μ (30-33 μ). **FV:** árbol o arbusto. **Ejemplar revisado:** C. Chan 4667. **Geol.** a449.

Luehea candida

(Moc. & Sessé ex DC.) Mart. Lám. 11:80
Abertura: Tricolporado. Colpo meridional largo de $45 \times 2 \mu$, colpo membrana lisa, colpo transversal lalongado rectangular de $2 \times 4 \mu$. Área polar grande (0.53). **Exina:** Subtectada, suprareticulada, heterobrocada. Exina de 2μ de espesor. Sex 2; Nex 1. **ASP:** Mónada, isopolar; radiosimétrica. **Forma:** Subprolado; CP: circular; CE: elíptico. **Tamaño:** P= 61.6μ (55-77 μ) E= 53.3μ (48-60 μ). **FV:** árbol. **Ejemplar revisado:** J. I. Calzada 7679. **Geol.** a451.

VERBENACEAE

Stachytarpheta jamaicensis (L.) Vahl Lám. 11:81
Abertura: Tricolporado. Colpos largos de 109.4μ . Área polar mediana (0.49). **Exina:** Tectada, verrugada, verrugas de $6 \times 6.5 \mu$. Exina de 5μ . Sex 3; Nex 2. **ASP:** Mónada; isopolar; radiosimétrica. **Forma:** Subprolado; CP: semiconvexa; CE:

LAMINA 10

LAMINA 10. MORACEAE: *Ficus pertusa* (65: vista polar y ornamentación) (1000x); *Trophis racemosa* (66: vista polar y ornamentación) (1000x); NYCTAGINACEAE: *Boerhavia erecta* (67: corte óptico y ornamentación)(500x); POACEAE: *Cynodon dactylon* (68: vista polar y ecuatorial) (500x); *Panicum laxum* (69: vista polar y ecuatorial) (1000x); *Paspalum plicatulum* (70: corte óptico y ornamentación) (500x); POLYGONACEAE: *Coccoloba reflexiflora* (71: vista ecuatorial y ornamentación) (500x); *Neomillspaughia emarginata* (72: vista polar y ecuatorial) (1000x).

LAMINA 11

LAMINA 11. RUBIACEAE: *Randia longiloba* (73: vista polar y ornamentación) (1000x); SAPINDACEAE: *Talisia floresii* (74: vista polar y ecuatorial) (1000x); *Thinouia paucidentata* (75: vista polar y ecuatorial) (1000x); SAPOTACEAE: *Pouteria amygdalina* (76: vista ecuatorial y ornamentación) (1000x); *Pouteria reticulata* (77: vista polar y ecuatorial) (1000x); SIMAROUBACEAE: *Simarouba glauca* (78: vista polar y ornamentación) (1000x); TILIACEAE: *Heliocarpus donnell-smithii* (79: vista ecuatorial y ornamentación) (1000x); *Lu-ehia candida* (80: vista polar y ecuatorial) (500x); VERBENACEAE: *Stachytarpheta jamaicensis* (81: vista polar y ecuatorial) (500x).

elíptico. **Tamaño:** P=121.5 μ (90-139 μ) E=97.3 μ (80-108 μ). **FV:** hierba. **Ejemplar:** P. Zamora C. 5149. **Geol.** a564.

Discusión

Dada la amplia diversidad de las comunidades tropicales en México, es importante documentar, a través de floras polínicas, la morfología de las distintas especies que las conforman. En este estudio se describen por primera vez para la zona, la morfología polínica de 81 especies de la selva mediana subperennifolia de la cuenca de río Candelaria correspondientes a 29 familias. Las investigaciones paleoecológicas basadas en el análisis del contenido de polen en sedimentos de diferentes cuerpos de agua de la península de Yucatán, han aportado datos sobre el impacto de los cambios climáticos y ambientales en la vegetación durante los últimos cientos de años (Leyden, 2002). Siendo el análisis de polen la herramienta para la reconstrucción de la historia de la vegetación, los conjuntos polínicos fósiles de zonas tropicales muestran que los granos de polen no son identificados a nivel específico, lo que lleva a la pérdida de información en las reconstrucciones paleo-ambientales. Una limitación importante para la correcta interpretación del impacto de las variaciones ambientales en la vegetación, ya sean climáticas y/o antropogénicas, es el conocimiento de la morfología polínica de las especies tropicales.

Agradecimientos

Al Dr. Jorge A. Benítez Torres del Centro de Ecología, Pesquería y Oceanografía del Golfo de México (EPOMEX) por su apoyo y contribución económica a través del proyecto "Sistema de Información Geográfica de la Cuenca del Río Candelaria: hacia un uso forestal sustentable y el entendimiento de los efectos de los cambios en la cobertura forestal sobre hidrología, calidad del agua y biodiversidad (CONAFOR- Centro EPOMEX de la Universidad Autónoma de Campeche (UAC). Al herbario UCAM del Centro de Investigaciones Históricas y Sociales de la Universidad Autónoma de Campeche y al Centro de Investigación Científica de Yucatán por los ejemplares proporcionados. Al Biol. Celso Gutiérrez y la M. en C. María C. Sánchez del herbario UCAM por su apoyo.

Literatura citada

- Alvarado J.L. y Palacios-Chávez R. 1987. Catálogo palinológico para la flora de Veracruz No. 35 familia Marcgraviaceae. *Biótica* **12**: 67-77.
- Arellano-Rodríguez J.A., Flores J.S., Garrido J.T y Bojorquez M.M.C. 2003. Nomenclatura, forma de vida, uso manejo y distribución de las especies vegetales de la Península de Yucatán. Fascículo 20 de la Colección Etnoflora Yucatanense. Universidad Autónoma de Yucatán. Méx. 900 p.
- Ayala-Nieto M.L. y Ludlow-Wiechers B. 1983. Catálogo palinológico para la Flora de Veracruz No. 13, familia Ebenaceae. *Biótica* **8**: 215-226.
- Benítez T.J.A., Sánchez H.S., Contreras J.L., Zamora P.C., Manilla M.M., Caussel F.M., Gil G.G., Couturier S., Zetina R.T., Calán R.Y., Amabilis L.S., Acuña C. y Mejenes M. 2005. Sistema de Información Geográfica de la Cuenca del Río Candelaria: Reconstrucción histórica de los cambios en la cobertura forestal y su efecto sobre la hidrología y calidad del agua. En: Kauffer Michel E.F. Ed. *El agua en la frontera México-Guatemala-Belice*, pp. 19-32, El Colegio de la Frontera Sur. Universidad Autónoma de Chiapas, México.
- Cronquist A. 1981. *An integrated system of classification of flowering plants*. Columbia University Press. Nueva York. 719 p.
- Erdtman G. 1969. *Handbook of Palynology: Morphology, taxonomy, ecology an introduction to the study of pollen grains and spores*. Hafner Publishing Co. New York. 486p.
- Flores G.J.S. 2001. *Leguminosae: florística, etnobotánica y ecología*. Fascículo 18. Etnoflora Yucatanense Universidad Autónoma de Yucatán. Mérida, Yucatán, México. 320p.
- Gómez-Pompa A. 1971. Posible papel de la vegetación secundaria en la evolución de la flora tropical. *Biotropica* **3**:125-135.
- Gutiérrez B.C. 2000. *Listado florístico actualizado del estado de Campeche, México*. Centro de Investigaciones Históricas y Sociales. Publicaciones de la Universidad Autónoma de Campeche. 95p.
- Kremp G.O.W. 1965. *Morphologic encyclopedia of palynology*. University of Arizona Press. Tucson. 263p.
- Leyden W.B. 2002. Pollen evidence for climatic variability and cultural disturbance in the Maya lowlands. *Ancient Mesoamérica* **13**:85-101.
- Lozano-García M.S. y Martínez-Hernández E. 1990. *Palinología de los Tuxtlas: especies arbóreas*. Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Biología. Publicaciones Especiales No. 3. 61p.
- Lozano-García M.S., Ibarra-Manríquez G. y Sosa-Nájera S. 1995. Palinología de las lianas de la Estación de Biología Tropical "Los Tuxtlas". *Boletín Sociedad de la Botánica de México* **57**:79-102.
- Lozano-García M.S., Sosa-Nájera M.S., Sugiura Y. y Caballero M. 2005. 23,000 years of vegetation history of the Upper Lerma, a tropical high-altitude basin in Central México. *Quaternary Research* **64**:70-82.
- Lozano-García M.S., Caballero M., Ortega B., Rodríguez A. y Sosa S. 2007. Tracing the effects of the little Ice Age in the tropical lowlands of eastern Mesoamerica. *Proceedings of the National Academy of Sciences* **104**: 16200-16203.
- Ludlow B.M.R. y Martínez-Hernández E. 1983. Morfología del polen de las Nyctaginaceae de México. *Biótica* **8**: 107-148.
- Macías C.A. y del Amo S.R. 2002. Caracterización del manejo forestal en el ejido de Xkan-Ha, Campeche, bajo el concepto de integridad. *Sociedades Rurales, Producción y Medio Ambiente* **3**:18-29.
- Martínez E., Sousa M. y Ramos A.C.H. 2001. *Listados Florísticos de México XXII. Región de Calakmul, Campeche*, pp 1-55. Instituto de Biología, UNAM.
- Niembro R.A. 1993. *Campeche en Flor*. Universidad Autónoma de Campeche, Dirección General de Estudios de Posgrado e Investigación. Centro de Investigaciones en Bosques Tropicales. Campeche, Campeche, México. 225p.
- Palacios-Chavez R. 1984. La morfología de los granos de polen de

- las especies mexicanas del género *Bursera*. *Biótica* **9**:153-182
- Palacios-Chávez R., Ludlow-Wiechers B. y Villanueva R.G. 1991. *Flora Palinológica de la Reserva de la Biosfera de Sian Ka'an Quintana Roo*. Centro de Investigaciones de Quintana Roo. México. 321p.
- Pedraza R.A. 1983. Estudio palinológico de la familia Convolvulaceae en México: 1. Géneros *Ipomea* L. y *Turbina* Raf. *Biótica* **8**:387-411.
- Punt W., Blackmore S., Nilsson S. y Thomas L.A. 1994. *Glossary of pollen and spore terminology*. LPP Contributions Series No.1, International Federation of Palynological Societies, 71p.
- Rico B.M. y Gómez-Pompa A. 1979. Estudio de las primeras etapas sucesionales de una selva alta perennifolia en Veracruz, México. En Gómez-Pompa A., Del Amo R.S. y Vázquez-Yañez C. Eds. *Investigaciones sobre la regeneración de selvas altas en Veracruz, México*, pp 112-202., Consejo Nacional para la Enseñanza de la Biología, Compañía Editorial Continental. México, D.F.
- Roubik D.W. y Moreno J.E. 1991. Pollen and spores of Barro Colorado Island. *Monographs in Systematic Botany* **36**:1-270.
- Rzedowski J. 1994. *Vegetación de México*. Editorial Limusa, S.A. de C.V. México. 432p.
- Rzedowski J. y Calderón de Rzedowski G. 1996. Burseraceae. Flora de Veracruz. Fascículo 94. Instituto de Ecología, A.C.-University of California. Xalapa, Veracruz. México, 37 pp.
- Sánchez-Dzib Y. 2007. Morfología polínica de especies de plantas de la selva mediana subperennifolia en la Cuenca del Río Candelaria, Campeche. Tesis de Licenciatura, Universidad Autónoma de Campeche. México. 189 pp.
- Wendt T. 1998. Composición, afinidades florísticas y orígenes de la flora arbórea del dosel de los bosques tropicales húmedos de la vertiente mexicana del Atlántico. En: Ramamoorthy T.P., Bye R., Lot A. y Fa J. Eds. *Diversidad Biológica de México. Orígenes y Distribución*, pp 581-664, Instituto de Biología, UNAM, México, D.F.

Recibido: 10 de septiembre de 2008

Aceptado: 21 abril de 2009